

KULLANIM KILAVUZU

PIASCLEDINE 300 mg kapsül

BİRİM FORMÜLÜ

Her kapsülde:

Sabunlaşmamış avokado ve soya ekstresi.....300 mg.

Bir kısım sabunlaşmamış avokado yağı, 2 kısım sabunlaşmamış soya yağı içermektedir.

Diğer maddeler: butil hidroksitoluen 0.03 mg, koloidal anhidrus silika (Aerosil 200) 7 mg.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ

Piascledine, bağ dokusu üzerine trofik etkileri olan bitkisel kaynaklı bir üründür. Proteoglikanların ve kollajen sentezini uyararak normal kıkırdak yapısını düzeltir. Ayrıca Kollajenaz tip II ve PGE2'yi de inhibe eder.

ÖNERİLEN KULLANIM YERİ

Bazı osteoartrit ağrılarında destekleyici tedavi olarak önerilmektedir.

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

Ürünün içeriğindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen bireylerde kullanılmamalıdır.

Doğal kauçuk latekse alerjisi olan hastalar, sistemik bir alerjik reaksiyon gelişme riskinden dolayı avokado yememeli, avokado ile temastan kaçınmalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER

Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildirin.

Hamilelik ve laktasyon dönemlerinde henüz araştırılmadığından, bu durumlarda kullanılmamalıdır.

Hayvanlardan elde edilen veriler: İlgili bir teratojenik etki bulunmamaktadır.

Klinik veriler: Şimdiye kadar, hamilelik sırasında Piascledine ile olası bir fetotoksik etkiyi veya malformasyon indüksiyonunu değerlendirebilecek yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, Hamilelik süresince Piascledine ile tedavi önerilmemektedir.

Beklenmeyen bir etki olduğunda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Nadiren yağ benzeri koku ile öğürme ortaya çıkabilir. Yemekle beraber alındığında bu etkiden kaçınılabılır.

Nadir olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları.

Çok nadir vakalarda transaminaz, alkalın fosfataz, bilirubin ve gama-glutamil transpeptidaz yükselmesini içeren karaciğer bozukluğu.

Gastrointestinal bozukluklar: Diyare ve epigastrik ağrı (sıklığı bilinmemektedir), bulantı, kusma, febril kolit.

Ateşle birlikte migren baş ağrısı

Sersemlik

Ürtiker, kaşıntı

Grip benzeri belirtiler

Egzama, kontakt dermatit

İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER

İlaç etkileşimleri: Antikoagülanlar, Monoamin oksidaz inhibitörleri

GÜNLÜK KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Günde bir kapsül, yemeklerle birlikte alınmalıdır. Kapsüller, oral olarak, çiğnenmeden bir bütün olarak bir miktar sıvı ile birlikte alınmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

15 kapsüllük blister ambalajlarda.

İZİN SAHİBİ:

Liba Laboratuvarları A.Ş.
Otağtepe Cad. No:5
34810 Kavacık- Anadoluhisarı / İstanbul

İZİN NO:

22.07.2004 – 2003/29

ÜRETİM YERİ:

LABORATOIRES EXPANSCIENCE
Rue des quatre Filles
28230 Epernon, Fransa

25°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

BU ÜRÜNÜN TIBBİ YARARI GELENEKSEL KULLANIMA VE LİTERATÜRE DAYANMAKTADIR. TIBBİ MÜSTAHAZAR (İLAÇ) OLARAK DEĞERLENDİRİLMEMİŞTİR.

SADECE ECZANELERDE SATILIR.

Kullanım Kılavuzu Onay Tarihi: 04.11.2011